

Neljäs lintuatlas 2022 – 2025


kolmas maastokausi alkaa
tilanne 2. kauden jälkeen

Stina Pohjankorpi

LHLH:n lintuatlastilanne 3/2024

- THE-prosentti 35,71% (3/2023 3,57%)
- Tavoite 2024: jokainen ruutu vähintään tyydyttävälle tasolle
- Tärkeä käydä läpi ruutuja, jotka eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla (keltaiset ja oranssit ruudut)
- Tärkeä nostaa pieniä lukuja ylös 1->2, 2->3, 3->4, 4->5 jne.
- Hyödynnä maastolomakkeita, niistä näet mitä ruudulta puuttuu verrattuna 3. atlakseen ja voit keskittyä puuttuviin lajeihin <https://havistin.biomi.org/atlas>
- Jokainen havainto tärkeä, myös matalat pesimävarmuusindeksit, nostavat kokonaislukua
- Lintuatlas.fi -sivulta löytyy lajikohtaiset atlasohjeet <https://lintuatlas.fi/lajikohtaiset-ohjeet/>

Vertailuna LHLH:n lintuatlastilanne 3/2023




Ruutujen selvitysasteet

Luokka	%	Ruutua
Ei havaintoja	0	0
Satunnaishavaintoja	57.14	16
Välttävä	39.29	11
Tyydyttävä	3.57	1
Hyvä	0	0
Erinomainen	0	0



LHLH:n lintuatlastilanne 3/2024



Ruutujen selvitysasteet

Luokka	%	Ruutua
Ei havaintoja	0	0
Satunnaishavaintoja	3.57	1
Välttävä	60.71	17
Tyydyttävä	32.14	9
Hyvä	0	0
Erinomainen	3.57	1



LHLH:n lintuatlastilanne 3/2024

- THE-prosentti 35,71% (3/2023 3,57%)

- Ruutujen tilanne:

S = Satunnaishavainnot, V = välttävä, T = tyydyttävä, H = hyvä, E = Erinomainen

* Lähimpänä seuraavaa PVI-selvitysastetta

Ruutu	Nro	Selvitysaste	PVI	Seuraavan PVI:n raja-arvo + selvitysaste	3. Atlas PVI + selvitysaste
Somero, Pitkäjärvi	673:329	S	93	109,6 V	215 T
Somero, Somerniemi	672:332	V	117	198,8 T	239 T
Somero, Oinasjärvi	671:332	V	138	200,4 T	223 T
Ypäjä, Ypäjänkylä	675:329	V	138	194,0 T	222 T
Salo, Kiikala	671:331	V	139	200,4 T	253 T
Ypäjä, Ypäjän keskusta	674:329	V	141	195,6 T	256 H
Tammela, Pihtikoski	675:332	V	142	194,0 T	286 E

LHLH:n lintuatlastilanne

Ruutu	Nro	Selvitysaste	PVI	Seuraavan PVI:n raja-arvo + selvitysaste	3. Atlas PVI + selvitysaste
Somero, Sylvänä	673:330	V	143	197,2 T	212 T
Somero, Lamminniemi	672:331	V	145	198,8 T	207 T
Tammela, Porras	674:333	V	146	195,6 T	291 E
Urjala, keskusta	677:331	V	154	190,8 T	219 T
Urjala, Kokonjärvi	677:332	V	169	190,8 T	281 E
Urjala, Mellola	678:331	V	171	189,2 T	264 H
Humppila, keskusta	676:330	V	174	192,4 T	223 T
Forssa, Koijärvi	676:332	V	181	192,4 T	254 H
Somero, Pajula	673:331	V	183	197,2 T	233 T
Tammela, Liesjärvi	673:333	V	187	197,2 T	284 H
Tammela, Teuro	675:333	V	190	194,0 T	301 E

LHLH:n lintuatlastilanne

Ruutu	Nro	Selvitysaste	PVI	Seuraavan PVI:n raja-arvo + selvitysaste		3. Atlas PVI + selvitysaste	
Somero, Häntälä	672:330	T	199	252,8	H	268	H
Tammela, Ruostejärvi	673:332	T	201	251,2	H	274	H
Forssa, Ojalanmäki	675:331	T	207	248,0	H	291	E
Tammela, keskusta	674:332	T	208	249,6	H	359	E
Urkala, Nuutajärvi	677:330	T	212	244,8	H	263	H
Urkala, Kortejärvi	678:330	T	215	243,2	H	254	H
Forssa, Matku	676:331	T	219	246,4	H	252	H
Jokioinen, Minkiö	675:330	T	232	248,0	H	285	E
Jokioinen, keskusta	674:330	T	234	249,6	H	302	E
Forssa, Pispanmäki	674:331	E	288			331	E




Huuhkaja


Maan eteläpuoliskossa kalliojyrkänteillä ja hakkuilla. Huhuilee auringonlaskun aikaan loppupalvella ja alkukeväällä, huuto kantautuu kauas.

Varo menemästä mahdolliselle pesäpaikalle ennen kesäkuuta, hylkää munapesänsä helposti.

Poikueet löydettävissä huutelupaikalta. Poikaset kerjäävät melko kuuluvasti lähellä pesäpaikkaa jopa syyskuulle saakka.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma






Varpuspöllö


Reviiri paikantuu kevättalvisesta vihellyksestä auringonlaskun aikaan.

Pesii käpytikan tai pohjantikan koloissa tai pöntöissä, joita oltava vähintään kaksi lähekkäin.

Poikueet ääntelevät melko kuuluvasti.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma



Lehtopöllö




Reviiri paikantuu kevättalvisesta huhuilusta hämärissä ja pimeällä.


Pesii pöntöissä, koloissa ja puun onkaloissa. Voi pesiä asutuksen tuntumassa, mutta on usein huomaamaton.

Poikaset äänтелеvät kuuluvasti.

Voi huhuilla jo syksyllä, mutta kannattaa odottaa pesimävarmuusindeksien kanssa kevätpuolelle, jolloin pesimäkausi varsinaisesti alkaa.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma






Viirupöllö


Reviiri paikantuu kevättalvisesta huhuilusta hämärissä ja pimeällä.

Pesii pöntöissä, koloissa, piippukeloissa ja haukkojen risupesissä.

Metsässä touko–kesäkuussa tavattu nokkaa napsuttava maastopoikanen on vaaran merkki: viirupöllöemo hyökkää empimättä tunkeutujan kimppuun.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma







Sarvipöllö

Pesii vanhoissa varislintujen pesissä,
joita maastossa riittää.

Pesintä paikantuukin helpommin
maastopoikasten kerjuuäänistä;
poikueiden ääni on tyypillinen
yölaulajaretkien ääni.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma






Helmipöllö


Reviiri paikantuu kevättalvisesta soidinpuputuksesta, mutta kaikki puputtajat eivät pesi.

Pesii palokärjen koloissa ja pöntöissä.

Poikasten ääntä voi kuulla yölaulajaretkillä, kun pysähtyy kuuntelemaan pöllöaikaan löytyneellä reviirillä.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma







Pikkukäpylintu

Pesintä alkaa varhain keväällä. Laulavan koiraan läheltä voi löytyä pesää rakentava naaras. Koiras käy ruokkimassa hautovaa naarasta.

Poikueet ovat alkukesästä jo liikkeellä. Kesällä havaittu kiertelevä lentokykyinen käpylintupoikue voi olla peräisin toiselta ruudulta. Parvelle sopii pesimävarmuusindeksi 1. Vastikään lentokykyisiksi tulleille poikasille voi antaa indeksin 73. Jos satut näkemään poikasten lähdön pesästä, indeksiksi käy 82.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma



Isokäpylintu

Pesintä alkaa varhain keväällä.

Seuraa lintuja huhtikuussa, menevät näkyvästi pesälle. Koiras käy ruokkimassa hautovaa naarasta. Pesä on usein helposti löydettävissä matalassa männyssä.

Poikueet ovat alkukesästä jo liikkeellä.




Kesällä havaittu kiertelevä lentokykyinen käpylintupoikue voi olla peräisin toiselta ruudulta.


Parvelle sopii pesimävarmuusindeksi 1.

Vastikään lentokykyisiksi tulleille poikasille voi antaa indeksin 73.


Jos satut näkemään poikasten lähdön pesästä, indeksiksi käy 82.

Pesintäsymbolit

-  Mahdollinen
-  Todennäköinen
-  Varma



Uudet lajit ruuduilla



- Uusien lajien määrä ei riipu kartoitusasteesta
 - LHLH: uusia lajeja 27/28 ruudulla
 - Yhteensä uusia lajeja 91 kpl
1. Tikli 11 ruudulla
 2. Pikkulokki, kehrääjä ja harmaapäätikka 6 ruudulla
 3. Kanadanhanhi, viitakerttunen, ja isolepinkäinen 5 ruudulla
 4. Tukkakoskelo, ruisrääkkä, naurulokki, viitasirkkalintu ja isokäpylintu 4 ruudulla
 5. Metso, peltopyy, merikotka, luhtahuitti, lehtopöllö, kulorastas, luhtakerttunen ja kultarinta 3 ruudulla

Pesimävarmuusindeksit

A. Epätodennäköinen pesintä (indeksi 1)

1. Havaittu pesimäaikaan lajin yksilö, mutta havainto ei viittaa pesintään kyseisessä atlasruudussa. Indeksiiin 1 luetaan ruudulla muuttomatkalla oleviksi tulkitut linnut (ylimuuttavat, muutolla lepäilevät), naapuriruudulle matkalla oleviksi tulkitut linnut (esim. ruoanhakumatkat), selvästi pesimättömät kiertelijät tai nuoret linnut sekä harvinaisuudet, joille atlasruutu ei ole levinneisyysaluetta. Indeksiiin 1 saavat myös lajit, joiden pesimäaika ei ole alkanut vielä tai on jo ohi (etenkin lajilistaa tehdessä).

B. Mahdollinen pesintä (indeksit 2–3)

2. Havaittu yksittäinen lintu kerran (esim. laulava tai soidinääntelevä koiras, nähty tai kuultu naaras) pesimäaikaan lajille sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista. Paikalla on joko käyty vain kerran tai lintu on tavattu vain kerran useista käynneistä huolimatta.

3. Havaittu pari kerran pesimäaikaan sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista.

Pesimävarmuusindeksit

C. Todennäköinen pesintä (indeksit 4–6, alaindeksit 61–66)

4. Havaittu laulava, soidinmenoja esittävä tai muuten samalla paikalla (eli pysyvällä reviirillä) pesimäaikaan oleskeleva koiras eri päivinä.
5. Havaittu pesimäaikaan samalla paikalla oleskeleva naaras tai pari eri päivinä.
6. Havaittu lintu tai pari pesimäaikaan tavalla, joka viittaa vahvasti pesintään.
Lintu/pari:
 - 61: käymässä useasti todennäköisellä pesäpaikalla (esim. laskeutuvan säännöllisesti samaan paikkaan ruoikkoon tai saareen).
 - 62: rakentamassa pesää (kaivamassa tai hakkaamassa pesäkoloa, kuljettamassa pesänrakennusmateriaalia, tms.).
 - 63: varoittelemassa, koska pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä.
 - 64: näyttelemässä siipirikkoa tai muulla tavoin houkuttelemassa havainnoijaa pois ilmeisen pesän tai poikueen luota.
 - 65: hyökkäilemässä tai muulla tavoin käyttäytymässä uhkaavasti havainnoijaa kohtaan (esim. pöllöt ja tiirat), koska pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä.
 - 66: Nähty pesä, jossa on samanvuotista rakennusmateriaalia (esim. petolintujen koristellut pesät) tai ravintojätettä; ei kuitenkaan varmaa todistetta munista tai poikasista.

Pesimävarmuusindeksit

D. Varma pesintä (indeksit 7–8, alaindeksit 71–75 ja 81–82)

7. Havaittu epäsuora todiste varmasta pesinnästä:

71: nähty pesä, jossa on pesitty samana vuonna, koska siinä on munia tai niiden kuoria, jätteitä poikasista, sulkatuppien ”hilsettä”, tms.

72: havaittu linnun menevän pesään tai lähtevän pesästä tavalla, joka selvästi viittaa pesimiseen (ei kuitenkaan ole nähty munia, tai nähty tai kuultu poikasia; esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit).

73: havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella.

74: havaittu emo kantamassa tai kuljettamassa ruokaa poikasille tai poikasten ulosteita; pesän voidaan katsoa olevan ruudun alueella.

75: nähty pesässä hautova emo.

8. Havaittu suora todiste varmasta pesinnästä:

81: kuultu poikasten ääntelevän pesässä (esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit).

82: nähty pesässä munia tai poikasia.

- salatut havainnot 90 vrk:n viiveellä sekä sensitiiviset lajit karkeistettuna ruudulla

Tärkeitä osoitteita

- Atlaksen tulospalvelu (LHLH):
<https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1096>
- Maastolomakkeet: <https://havistin.biomi.org/atlas>
- Lajikohtaiset ohjeet: <https://lintuatlas.fi/lajikohtaiset-ohjeet/>
- Atlaksen ohje- ja uutissivut: <https://lintuatlas.fi>
- Salaukset tulospalvelussa: <https://laji.fi/about/709>
- Pesimävarmuusindeksit ja tulkintaohjeita:
<https://lintuatlas.fi/indeksit/>